



Dr. med. vet. Erich Schwarzmann | Alberschwende | Praxis für Klein- und Großtiere

## Impfplan Katze

Beginn der Impfungen: je nach Situation und Belastungsgrad zwischen 6. und 10. Lebenswoche, dann erfolgen Auffrischungen im Abstand von 3 – 4 Wochen, sodass die letzte Impfung nach der 15. Lebenswoche gegeben wird.

•**8. Woche:** Katzenschnupfen-Parvovirose; bei Bedarf geben wir Leukose eine Woche später

•**12. Woche:** Katzenschnupfen-Parvovirose; bei Bedarf geben wir Leukose eine Woche später

•**16. Woche:** Katzenschnupfen-Parvovirose-Leukoseimpfung

•**16. Monat:** - Abschluss der Grundimmunisierung: Katzenschnupfen-Parvovirose-Leukose Impfung, bei Bedarf kann Tollwut eine Woche davor oder danach gegeben werden

•**Wiederholungsimpfungen** alle 1-4 Jahre, je nach Impfstoff und Belastung. Parvovirose, Tollwutimpfung alle 3-4 Jahre; Katzenschnupfen soll jährlich aufgefrischt werden.

•**Leukoseimpfung:** in unserem ländlichen Gebiet ist die Leukose (ansteckende Leukämie mit tödlichem Ausgang) im zunehmen – wir empfehlen daher dringend diese Impfung. Vor der Impfung soll mit einer Blutprobe überprüft werden, ob die Katze bereits angesteckt ist und damit die Impfung sinnlos ist.

•**Tollwutimpfung:** nach neuesten Studien soll diese Impfung nicht mit anderen Impfungen kombiniert werden. Diese Impfung kann einzeln dazwischen geimpft werden. Durch die Impfung der Füchse ist das Risiko für Katzen derzeit sehr gering. Wir impfen die Tollwut nur noch bei Bedarf. Für Grenzübertritte ist sie aber zwingend vorgeschrieben (nachgewiesener Impfschutz durch vorausgegangene Tollwutimpfungen oder eine Impfung einen Monat vor dem Grenzübertritt)

•**Chlamydien/Bordetellen – Impfungen:** für Katzen mit hoher Umgebungsbelastung (mehrere Katzen in einem Haushalt, Abgabe ins Tierheim oder Katzenpensionen), Die Chlamydienimpfung ist ab der 8. Lebenswoche möglich und muss nach 3-4 Wochen und in der 16. Lebenswoche wiederholt werden. Die Bordetellaimpfung ist eine „Nasenschluckimpfung“ und kann schon mit 4 Wochen gegeben werden. Soll 4 Wochen vor dem Verbringen in die Katzenpension gegeben werden. Die Immunität hält ein Jahr.